

LE RETOUR À LA MAISON APRÈS UNE TRANSFUSION

Il existe un faible risque de réaction à la transfusion sanguine que vous avez reçue. De retour à la maison, vous devez surveiller l'apparition de nouveaux symptômes pendant quelques heures.

CE QUE VOUS POURRIEZ CONSTATER APRÈS UNE TRANSFUSION DE SANG

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE SI VOUS AVEZ UNE RÉACTION

SYMPTÔMES BÉNINS :

Fièvre légère – température de moins de 39°C (102,2°F)

Légers frissons

Léger mal de tête

Rash bénin, urticaire, démangeaisons

Ne prenez aucun des médicaments ci-dessous si le médecin vous l'a interdit. Suivez toujours les directives sur l'emballage.

Un médicament en vente libre contre la fièvre ou le mal de tête comme Tylenol® (acétaminophène) peut soulager vos symptômes.

Un médicament en vente libre contre les allergies, comme Benadryl® ou Reactine® peut soulager vos symptômes.

Si vous ne constatez aucun changement dans l'heure suivant la prise du médicament, suivez les directives ci-dessous.



SYMPTÔMES GRAVES :

Fièvre élevée – température de 39°C (102,2°F) ou plus
Nausées ou vomissements

Tremblements (frissons importants)

Difficultés à respirer ou manque de souffle

Sang dans les urines ou urine très foncée (même quelques jours plus tard)

Migraine ou mal de tête intense

Communiquez avec le médecin si possible ou rendez-vous à l'Urgence la plus proche. Dites au personnel que vous avez peut-être une réaction transfusionnelle.
Ne conduisez pas pour vous y rendre.

Rendez-vous immédiatement à l'Urgence la plus proche. Dites au personnel que vous avez peut-être une réaction transfusionnelle.
Ne conduisez pas pour vous y rendre.

Toute réaction transfusionnelle doit être documentée.

Dès que possible, veuillez avertir _____
au _____ pour que votre dossier puisse être mis à jour.